

ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Люир Хлор

Натриевая соль дихлоризациануровой кислоты, ПАВ
Содержание активного хлора – 53,5%



Спектр активности:

Бактерицидная: Гр+ и Гр- бактерии, включая возбудителей туберкулеза, ВБИ и ООИ (чума, туляремия, холера, сибирская язва)

Вирулицидная: энтеральные и парентеральные гепатиты, ВИЧ, полиомиелит, аденовирусы, энтеровирусы, ротавирусы, вирусы «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа A/H1N1, герпеса

Фунгицидная и Спороцидная: грибы рода Кандида, дерматофиты



Основные режимы

Дезинфекция поверхностей (бактерии)	0,03% / 30 мин
Дезинфекция поверхностей (вирусы)	0,015% / 60 мин
Дезинфекция поверхностей (туберкулез)	0,06% / 60 мин
Проведение генеральных уборок	0,03% / 30 мин
Дезинфекция ИМН	0,2% / 60 мин

% / время экспозиции

Преимущества:

- + Точность и легкость дозировки благодаря удобной форме (в виде таблеток или гранул)
- + Можно применять как в виде растворов, так и в сухом виде для дезинфекции всех видов биологических выделений на поверхностях и в емкостях
- + Применяется в пищевой промышленности, на объектах общепита, для обеззараживания скорлупы пищевых яиц

